



Consentement éclairé à l'extraction des dents

Risques et complications associés à l'extraction des dents

- Atteinte des structures nerveuses adjacentes : Le traumatisme d'un nerf sensitif comme le nerf lingual ou le nerf alvéolaire inférieur peut conduire à une paresthésie (perte de la sensation de l'endroit innervé : langue, menton, lèvre inférieure). Le plus souvent, l'engourdissement est temporaire, mais, dans de rares cas, peut être permanent.
- Dommage au sinus maxillaire : Parfois, la racine d'une dent supérieure peut se retrouver en partie dans le sinus. Lors de l'extraction de cette dent, il se forme alors une communication entre la cavité sinusale et la cavité buccale.
- Dommages aux structures adjacentes : dents, fracture radiculaire, fracture mandibulaire
- Saignement/ hémorragie
- Infection
- Alvéolite : Perte prématurée du caillot sanguin servant à la guérison de l'alvéole dentaire. Plus fréquemment, cela se produit 2-3 jours après l'extraction et se manifeste par une douleur aigue pouvant irradier jusqu'à l'oreille et une mauvaise haleine.
- Autres inconvénients : œdème, douleur myofaciale, trismus, trouble à l'articulation temporo-mandibulaire, difficulté d'ouverture, douleur et inconfort, perte osseuse

Consentement éclairé à l'extraction dentaire

Je comprends la nécessité et les limites de l'extraction dentaire ainsi que les risques et complications liés à cette procédure. Je comprends que le succès de la chirurgie dépend aussi du suivi des instructions post-opératoires ainsi que la prise de la médication prescrite. Je suis tenu de rapporter tout changement de ma condition de santé au cabinet dentaire dans les plus brefs délais.

Nom du patient :

Signature du patient :

Nom du dentiste :

Signature du dentiste :

Date : _____